

## عوامل خطر آمبولی ریه

- ✓ سن بالای ۶۰ سال
- ✓ هرگونه آسیب یا بیماری که نیاز به استراحت طولانی در بستر دارد..
- ✓ جراحی اخیر
- ✓ نارسایی احتقانی قلب
- ✓ کم خونی
- ✓ شکستگی استخوان.
- ✓ چاقی
- ✓ استعمال دخانیات
- ✓ بارداری
- ✓ مصرف قرص های ضدبارداری به خصوص در خانمهای سیگاری

## تعریف:

آمبولی ریه به وجود لخته خون یا چربی در یکی از سرخرگهایی که به بافت ریه خونرسانی میکند گفته میشود. بنابراین آمبولی ریه مانع خونرسانی به ریه میشود.

## علائم شایع آمبولی ریه:

- ✓ کوتاهی نفس کشیدن غش کردن یا حالت غش پیدا کردن
- ✓ سرفه وگاهی همراه با خلط خونی
- ✓ تندی ضربان قلب
- ✓ تب خفیف
- ✓ قبل از بروز علائم فوق معمولاً درم و درد اندام تحتانی وجود دارد.


## علل آمبولی ریه:

لخته شدن خون در وریدهای عمقی علت اصلی است هر زمان که خون در داخل ورید تجمع یابد و به خوبی جریان نداشته باشد آمبولی میتواند ایجاد شود



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

## آمبولی ریه



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی

امام خمینی (ره) شهریار

واحد آموزش سلامت

تدوین: بهمن ۱۴۰۲

منبع: کتاب قلب و عروق برونر و سودارت

پزشک تایید کننده: خانم دکتر لیلا سادات حسینی

متخصص بیهوشی

آدرس سایت بیمارستان : [hospekshh.iums.ac.ir](http://hospekshh.iums.ac.ir)


جهت دسترسی به مطالب آموزشی بیشتر اسکن نموده و وارد فایل گروه

آموزشی از طریق آدرس سایت گردید ..



## درمان آمبولی ریه:

- ✓ هدف از درمان، حفظ عملکرد قلب و ریه در حد قابل قبول و جلوگیری از عود آمبولی
- ✓ قرار دادن صافی در داخل ورید بزرگ برای جلوگیری از حرکت لخته به سمت قلب و ریه
- ✓ استفاده از جوراب کشی
- ✓ بالا قرار دادن پاها بالاتراز سطحبستر در هنگام خوابیدن
- ✓ استفاده از داروهای ضدانعقاد
- ✓ تجویز اکسیژن



## عوارض آمبولی ریه:

- ✓ مرگ سریع در مواردی که لخته بزرگ باشد و نیمی از جریان خون ریه ها را مسدود کند.
- ✓ خونریزی شدید در داخل ریه

## راههای تشخیصی:

- ✓ رادیو گرافی قفسه سینه
- ✓ اسکن ریه
- ✓ آنژیوگرافی ریه.
- ✓ سمع ریه
- ✓ نوار قلب
- ✓ آزمایش زمان لخته شدن خون

## نکته :

- تا هنگام برطرف شدن علایم التهابی ناشی از لخته شدن خوندر بستر استراحت نمایید.
- در طی استراحت اندامهای تحتانی را برای جریان داشتن خون حرکت دهید

## پیشگیری از آمبولی ریه

- ✓ از استراحت طولانی مدت در بستر خودداری گردد.
- ✓ در طی دوره نقاهت بیماری از جوراب کشی استفاده نمایید
- ✓ پس از جراحی هرچه سریعتر حرکت اندامهای تحتانی و راه رفتن را شروع کنید.
- ✓ خودداری از استعمال دخانیات به خصوص در خانمهای بالای ۳۵ سال که قرص ضدبارداری مصرف میکنند
- ✓ اجتناب از جراحی های غیر ضروری
- ✓ اجتناب از نشستن های طولانی مدت
- ✓ استفاده از داروهای رقیق کننده خون و ضدانعقادها تحت نظر پزشک معالج