

طریقه مصرف انوکسپارین سدیم:

انوکسپارین داروی بدون نسخه نیست و بسته به مشکل شما پزشک معالج آن را تجویز میکند. لذا انوکسپارین را دقیقاً مطابق با دستور پزشک خود مصرف و از تغییر مقدار آن جدا پرهیز نمایید.



انوکسپارین سدیم (کلگزان)

انوکسپارین یک داروی ضد انعقاد میباشد که از لخته شدن خون جلوگیری میکند. این دارو معمولاً برای پیشگیری از تشکیل لخته های خونی در عروق پاها (ترومبوز وریدی عمقی) بکار میرود. این لخته های خونی در صورت تشکیل، ممکن است به ریه ها مهاجرت کرده و سبب بروز آمبولی ریوی شوند. برخی بیماران بیشتر مستعد ترومبوز وریدی عمقی هستند، مثل افرادی که تحت اعمال جراحی تعویض مفصل لگن و زانو قرار می گیرند و تا مدتی پس از عمل بی حرکت میمانند.



انوکسپارین سدیم (کلگزان)

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام

خمینی (ره) شهریار

واحد آموزش سلامت

بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

منبع: بروزر و سودارث

آدرس سایت بیمارستان: hospekhsh.iums.ac.ir

جهت دسترسی به مطالب آموزشی بیشتر اسکن نموده و

وارد فایل گروه آموزشی از طریق آدرس سایت گردید



موارد منع مصرف:

انوکساپارین نباید در افراد دچار خونریزی فعال و شدید مصرف شود. در صورت فراموش کردن یک دوز انوکساپارین، به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده آن را تزریق کنید. اما اگر تقریباً زمان نوبت بعدی رسیده است، نوبت فراموش شده را رها کرده طبق برنامه منظم خود عمل کنید. مقدار دارو را دو برابر نکنید.



تداخلات دارویی انوکساپارین:

تداخلات دارویی ممکن است عملکرد و تأثیر داروها را تغییر دهد یا باعث افزایش ریسک بروز عوارض جانبی آنها شود. بنابراین برای مصرف این دارو، لیست تمام داروهایی که مصرف می‌کنید اعم از داروهای تجویزی و غیرتجویزی (گیاهی، مکمل و ..) را با پزشک تان در میان بگذارید. از جمله داروهایی که با داروی انوکساپارین تداخل دارند، عبارتند از:

* داروهای ضد انعقاد (مانند وارفارین)

* داروهای با اثرات ضد پلاکتی (مانند پلاویکس

)

دارو را در جایی خشک و خنک و به دور

از گرما و تابش نور مستقیم نگه دارید.

هشدارها و موارد احتیاط:

موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

* اگر به انوکساپارین، هپارین و یا هر داروی دیگری حساسیت دارید.

* اگر داروهای خاصی مصرف میکنید.

* اگر مبتلا به بیماری هستید یا سابقه ابتلا به آن را دارید خصوصاً بیماری کبدی، کلیوی یا قلبی، اندوکاردیت (نوعی عفونت قلب)، دریچه مصنوعی یا پیوندی قلبی، پرفشاری خون، سکتة مغزی، دیابت، مشکلات چشمی، تهدید به سقط، اختلالات انعقادی از جمله کمی پلاکت خون، زخم معده و خونریزی اخیر گوارشی.

* قصد انجام عمل جراحی اعم از اعمال دندانپزشکی دارید.

* اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید.

* اگر به کودک خود شیر می دهید.

- در طول مدت درمان حتماً با پزشک خود بطور مرتب در تماس باشید. لازم است وی وضعیت بیماری، پاسخ به درمان و برخی تست های آزمایشگاهی شما را کنترل کند.