



اگر فاویسم درمان نشود ، شخص به کما رفته ، بیهوش می شود . و به تزریق خون نیاز پیدا می کند . در نوزادان و بچه های کوچک ، موارد بسیار شدید فاویسم می تواند کشنده باشد . میزان قرار گرفتن در معرض باقلا موجب بروز بیماری می شود که به شدت شرایط فردی و محیطی بستگی دارد .

فاویسم که در زیرگروه بیماری های عفونی قرار می گیرد، در همه افراد و به خصوص در کودکان باید بسیار جدی گرفته شود، چراکه کم خونی ناشی از این بیماری در صورت عدم کنترل به موقع می تواند آسیب جدی به کبد و کلیه وارد کند.

فاویسم:

والدین گرامی کودک شما مبتلا به بیماری فاویسم است که علت آن کمبود یا نقض آنزیمی در گلبول قرمز به نام G6PD می باشد. بروز این بیماری با مصرف باقلا و بعضی داروهای مصرف شده و یا عفونت هایی مثل بیماری های تب دار ارتباط دارد.

علائم بیماری:

وقتی کودک شما در معرض بعضی از داروها که بعدا نام برده خواهد شد قرار گیرد و یا به بعضی عفونت ها مبتلا شود و یا باقلا به هر شکل (خام یا پخته) مصرف نماید ۲۴ تا ۴۸ ساعت و بعضی اوقات ۵ تا ۲۴ ساعت پس از تماس ، علائم به شکل تب ، تهوع، استفراغ، دل درد، اسهال، تیره رنگ شدن ادرار ، رنگ پریدگی، سر گیجه، کاهش ادرار و تپش قلب نمایان میشود.

در صورت مشاهده علائم فوق کودک خود را سریع به نزدیکترین مرکز درمانی برسانید.

فاویسم یک بیماری ارثی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود



فاویسم



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی

امام خمینی (ره) شهریار

واحد آموزش سلامت

بازنگری : اردیبهشت ۱۴۰۵

منبع: کودکان مارلو

پزشک تایید کننده: خانم دکتر سجادی

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس سایت بیمارستان: hospekhsh.iums.ac.ir

جهت دسترسی به مطالب آموزشی بیشتر اسکن نموده و وارد فایل گروه آموزشی از طریق آدرس سایت گردید .



درمان بیماری فاویسم:

این بیماری درمان قطعی ندارد و تنها اقدام موثر پیشگیری از بروز حمله همولیز با پرهیز از مواجهه با مواد اکسیدان و در صورت بروز حمله مراجعه سریع به پزشک جهت اقدامات نگهدارنده و حمایتی برای پیشگیری از عوارض همولیز است

پیشگیری همیشه آسان نیست:

به گفته متخصصان عفونی، پیشگیری از ابتلا به فاویسم در مواردی که بیماری در شخص همچنان ناشناخته است، آسان نیست، چراکه در صورت ابتلای قبلی به بیماری می‌توان با دور بودن از عوامل غذایی، شیمیایی و دارویی حساسیت‌زا از بروز بیماری جلوگیری کرد، اما در صورت پنهان بودن بیماری بخصوص در کودکان، پیشگیری بسیار مشکل خواهد بود.



توصیه های پرستاری:

- رژیم غذایی کودک شما عادی است جز اینکه مصرف باقلا به هیچ شکل (خام یا پخته) مجاز نیست. و تا حد امکان از تماس کودک با پوست باقلا نیز خودداری کنید. حتی کودک فاویسمی خود را به مزارع باقلا هم نبرید.

- اگر به کودک فاویسمی خود شیر می‌دهید شما هم باید از مصرف باقلا خودداری کنید و اگر حتی یک دانه هم مصرف نمودید باید تا ۳ روز شیر مادر را قطع نمایید.

- در صورت بروز تب کودک را با آب ولرم تن شویه کنید. از شیاف استامینوفن استفاده و به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

- هیچ دارویی را بدون نظر پزشک به کودکان ندهید و در صورت مراجعه به پزشک حتماً به وی بگویید که کودک شما فاویسمی است.

- علائم حمله فاویسم به صورت تب، تهوع، استفراغ، سرگیجه و بیحالی، زردی و پررنگ شدن ادرار به رنگ چای و یا گاهی به رنگ خون و کم شدن میزان ادرار می‌باشد و در این صورت به کودکان مایعات شیرین و بیرنگ مانند آب بسیار و یا آب انگور بدهید و به بیمارستان یا درمانگاه مراجعه کنید.

- دقت کنید کودکان در معرض برخی مواد شیمیایی مثل نفتالین، بنزین و حشره کش ها قرار نگیرد.

- توجه نمایید برخی از داروها برای کودک شما ممنوع می‌باشد مانند: کوتریموکسازول، ویتامین K، داروهای ضد مالاریا، آسپرین، سولفامیدها و حنا.

- با انجام یک آزمایش ساده خون و اندازه گیری میزان آنزیم G6PD می‌توانید متوجه شوید کودکان فاویسمی است یا نه. تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری نمایید.

