




کورتاژ



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام خمینی (ره)

شهریار

واحد آموزش سلامت

بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

منبع: مادران ویلیامز

آدرس سایت بیمارستان: hospekshsh.iums.ac.ir

جهت دسترسی به مطالب آموزشی بیشتر اسکن نموده و وارد فایل گروه آموزشی از طریق آدرس سایت گردید.



کورتاژ: بازکردن دهانه رحم و تخلیه نسج آن

راگویند. این عمل یکی از شایع ترین عمل های زنان است. می تواند برای تشخیص یا درمان خونریزی های غیرطبیعی زنان به کار رود.

انواع کورتاژ: بر اساس علت انجام کورتاژ.

عمل کورتاژ دارای دو نوع درمانی و تشخیصی می باشد:

کورتاژ درمانی: به دلیل جلوگیری از ایجاد

عفونت یا خونریزی شدید از عمل کورتاژ جنین برای خارج کردن بافت های جفت موجود در رحم در حین سقط جنین و یا بعد از آن استفاده میشود.

کورتاژ تشخیصی: پزشک ممکن است جهت

نمونه برداری برای تشخیص مواردی مانند پولیپ و یا سرطان رحم از عمل کورتاژ استفاده کند که در این صورت به آن کورتاژ تشخیصی می گویند. همچنین کورتاژ تشخیصی در صورت مشاهده علائمی مانند خونریزی غیر طبیعی رحم. خونریزی بعد از قاعدگی و یا یافتن سلول هلی غیر طبیعی در تست های تشخیصی سرطان نیز انجام میشود.



عوارض کورتاژ:

عمل کورتاژ یک روش کاملاً طبیعی و ایمن در موارد سقط جنین خونریزی شدید و خونریزی غیر طبیعی است. اما همانند سایر روش‌های جراحی خطرات و عوارض خود را دارد که ممکن است حتی بعضی از آن‌ها بسیار نادر باشند. به طور مثال سوراخ شدن رحم و عفونت از مهمترین عوارض کورتاژ هستند. در موارد نادر کورتاژ پس از سقط جنین ممکن است باعث ایجاد چسبندگی در رحم شود که به آن سندرم آشرمن می‌گویند. بافت اسکار (محل زخم) می‌تواند سبب ناباروری و تغییر در نظم قاعدگی گردد که معمولاً با جراحی قابل درمان است. بیشتر عوارض کورتاژ از جمله عفونت قابل درمان هستند.

در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر

سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید:

ترشحات غیر طبیعی یا بد بوی واژینال
درد شکمی

خونریزی غیر طبیعی
گرفتگی عضلانی غیر طبیعی
تب

تشکیل لخته خون به دلیل عدم تحرک

نکات مهم:

۱- تازمان بهبودی کامل فعالیتهای خود را محدود نمایید و استراحت کافی داشته باشید.

۲- در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا ۶ ماه به تاخیر اندازید تا رحم شما آمادگی لازم را پیدا کند و با پزشک خود مشورت نمایید.

۳- ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت کنید و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نمایید.

۴- قرص‌های آهن تجویز شده توسط پزشک را تا ۳ ماه مصرف نمایید.

۵- قرص‌های مسکن و آنتی بیوتیک‌های تجویز شده توسط پزشک را سر ساعت مصرف کنید

۶- میتوانید بعد از یک هفته استراحت بدون هیچ مشکلی روابط عادی خود را از سر بگیرید.

۷- در صورت بروز علائمی چون تب، ترشحات زیاد، درد زیاد در قسمت زیر شکم، افزایش خونریزی، ترشحات بدبو و علائمی چون ضعف و سردی و بیحالی به پزشک خود اطلاع دهید.

